

Врач Моисеенко Е.Е. из Новосибирского Государственного Медицинского Университета изучил осведомленность врачей-терапевтов о содержании глютена в медикаментах, рекомендуемых пациентам с целиакией.

Данное сообщение привлекло внимание РДА потому как у детей с целиакией и синдромами мальабсорбции сахарный диабет 1 типа встречается в 6 раз чаще. Исключение глютена из питания детей с СД 1, у которых выявляются соответствующие противоглютеновые антитела позволяет получать лучшую компенсацию диабета и более легкие формы его течения.

По специально составленному опроснику было опрошено 52 врача-терапевта. Установлено:

1. 75 % врачей не задумывались о содержании глютена в составе лекарственных средств.
2. 12 % знают об этом, но не считают важной эту информацию
3. Из оставшихся 17-- ти врачей ни один не уверен в отсутствии глютена в большинстве лекарственных средств; т.к. ни в одной инструкции препаратов это не указывается.

В качестве основного источника информации врачи называют «Список препаратов, содержащих глютен», опубликованный на сайте kronportal.ru куда сведения поступают от пациентов и врачей, но никакими официальными документами не подтверждены.

Данные автора указывают на необходимость повышения ответственности фармацевтических компаний в маркировке производимых ими препаратов на отсутствие в них глютена, создание списка безглютеновых лекарственных препаратов основано на официальных документах, в том числе для первичной профилактики

глютениндуцированного СД 1 у детей.