Российская фирма ОАО «Акрихин» внедрила в практику комбинированный препарат, состоящий из 40 мг гликлазида и 500 мг Метформина. Безопасное и экономичное лечение пациентов с впервые выявленным СД 2 является актуальной задачей современной диабетологии.

Поэтому мы обращаем внимание на сообщение Доскиной Е.В. и соавт. из РМАПО, Москва, отметившей, что комбинированная терапия посредством Г. является эффективной и безопасной при лечении женщин пожилого и старческого возраста с впервые выявленным СД 2. Применение препарата оказало положительное влияние на динамику маркеров углеводного обмена при отсутствии резких падений сахара в крови. Была отмечена высокая степень согласия пациентов к данному виду лечения. В исследование были приняты 21 женщина в возрасте от 75 до 89 лет с СД 2 стажем от 1 до 12 месяцев. Определялись: тощаковая и послепищевая гликемии, гликированный гемоглобин, инсулин; оценивался индекс массы тела (ИМТ), объем талии. Изначально у всех пациенток уровень гликированного гемоглобина был выше 9%. Все пациентки прошли обучение в специализированной школе больных сахарным диабетом. Длительность наблюдения составила 3 месяца. Через 3месяца целевых значений сахара в крови достигли 90,5% пациенток. Резких снижений уровней сахара в крови не выявлено. Отмечено незначительное снижение ИМТ на 5,3% и объема талии на 2,25%. Не зафиксировано ни одного отказа от приема препарата. При анкетировании отмечено удобство в применении, отсутствие побочных явлений. 100 % женщин высказали желание продолжить данный вид лечения.